

Problem	Medikament	Einnahme	Anwendung
Gelenkschmerzen	Arcoxia 60mg	1 - 0 - 0 bei Bedarf	Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin hat Ihnen dieses Arzneimittel verschrieben, um die Symptome Ihrer degenerativen oder entzündlichen Gelenkerkrankung (Arthrose) zu behandeln. Arcoxia ist auf Verschreibung Ihres Arztes bzw. Ihrer Ärztin erhältlich.
Augen (Entzündungen / Rötungen, Bindehaut)	Fucithalmic Salbe		Fucithalmic enthält ein Antibiotikum, das bei bakteriellen Infektionen des Auges auf Verschreibung des Arztes oder der Ärztin angewendet wird.
Augen (bakteriellen Erkrankungen)	Desomedin DD	2 Tropfen 4-6 / Tag	Desomedin Augentropfen enthalten eine antibakterielle Wirksubstanz. Das Arzneimittel wird bei bakteriellen Erkrankungen des Auges und seiner Umgebung wie Konjunktividen, Infektionen des Lidrandes (Gerstenkorn) und der Tränenwege angewendet.
Blasen / Nieren	Ciproxin 500mg	3 Tage 2x Täglich	Ciproxin ist ein Antibiotikum zur Behandlung bakterieller Infektionskrankheiten. Es gehört zur Gruppe der Chinolone und besitzt eine antibakterielle Wirkung gegen eine Vielzahl von Bakterienarten. Ciproxin eignet sich zur Behandlung von Infektionskrankheiten wie: Infektionen der Atemwege; Hals-Nasen-Ohren-Infektionen; Mund-Zahn-Kiefer-Infektionen; Infektionen der Nieren und der Harnwege; Infektionen der Geschlechtsorgane; Infektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe; Infektionen des Magen-Darm-Traktes; Infektionen des Bauchraumes, einschliesslich des kleinen Beckens; Infektionen der Haut- und Weichteile; Infektionen der Knochen und Gelenke;
Nierenkolik	Novalgin 500mg + Irfen		Bei Nierensteine Novalgin enthält als Wirkstoff Metamizol (auch unter dem Namen Novaminsulfon bekannt), ein schmerzlinderndes, krampflösendes und fiebersenkendes Medikament aus der Gruppe der sogenannten Pyrazolone.
Durchfall	Carbolevure		Carbolevure enthält zwei natürliche Substanzen, Kohle und Hefe, die sich in ihrer Wirkung gegenseitig ergänzen. Kohle bindet Schadstoffe und Hefe reguliert die Darmflora. Carbolevure kann zur Bekämpfung von Durchfallserkrankungen und zur Regulierung und Normalisierung der Darmflora eingesetzt werden. Nach ärztlicher Verordnung oder auf Empfehlung des Apothekers wird dieses Präparat auch gegen Darmstörungen bei Antibiotikatherapie verwendet.

Durchfall (kein Blut im Stuhl + Fiber)	Imodium-Ligual		Imodium/Imodium lingual ist ein gut wirksames Mittel gegen plötzlichen (akuten) und längerdauernden (chronischen) Durchfall verschiedenster Ursache. Imodium/Imodium lingual kann auf Verordnung des Arztes oder der Ärztin auch angewendet werden bei Durchfall, der nach operativer Dünndarmverkürzung auftreten kann. Es hemmt die Darmbewegung durch eine direkte Wirkung auf die Darmmuskulatur, dadurch wird der Stuhl dicker und die Anzahl der Stuhlgänge vermindert. Die Wirkung für Tabletten und Kapseln kann nach etwa zwei Stunden eintreten.
Darmflora	Prolora Darm	1x Täglich	Aktiv-Kulturen Milchsäurebakterien: Optimierte Verwertung im Körper durch Flüssiganwendung. 1x täglich – einfach in der Anwendung Zur natürlichen Unterstützung der Darmflora mit B2 und Niacin Für ein intaktes Immunsystem dank Zink.
Husten	Bexin 2.5mg	3 - 4 mal / Tag nach dem Essen	Bexin ist ein Hustenmittel mit dem Wirkstoff Dextromethorphan. Es unterdrückt den übermässigen Hustenreiz.
Husten verschleimt	Resyl plus		Resyl Plus ist ein Hustenmittel, das zwei Wirkstoffe enthält. Der eine Wirkstoff, Guaifenesin, verflüssigt den zähen Schleim in den Luftwegen und fördert den Auswurf. Der andere Wirkstoff, Codein, dämpft den Hustenreiz und vermindert die Häufigkeit der Hustenanfälle.
Insektenstiche	Antibrumm Forte / Fenistil gel		
Erkältung / Halskehre / Muselkater	Tigerbalsam		
Schmerzen (Kopf, Rücken, Grippe)	Ibuprofen 600mg	1 - 1 - 1	Ibuprofen Sandoz enthält den Wirkstoff Ibuprofen, mit den für die wirksame Behandlung rheumatischer Krankheiten erforderlichen schmerzstillenden, entzündungshemmenden und fiebersenkenden Eigenschaften.
	Irfen 600mg		Generikum zu Ibuprofen
Erkältung	Neocitran		NeoCitran Grippe/Erkältung bringt Erleichterung bei Grippe und Erkältungssymptomen, lindert Beschwerden wie Frösteln, Glieder- und Kopfschmerzen, Schnupfen und senkt das Fieber. Der enthaltene Wirkstoff ist Paracetamol.
Magenschutz nach Irfen / Ibuprofen	Pantoprazol Sandoz 20	1 - 0 - 0	
Haslschmerzen	Mebucain		Mebucaine N wird zur kurzfristigen symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei leichten Entzündungen im Mund-Rachen-Raum angewendet.

Übelkeit	Paspertin		Paspertin enthält als Wirkstoff Metoclopramid. Es sorgt für eine geregelte Entleerung des Magens und einen geregelten Weitertransport des Darminhaltes. Ausserdem beseitigt Paspertin Brechreiz und Erbrechen.
Seekrankheit	Itinerol B6	4x / Tag	Itinerol B6 Kapseln enthalten Wirkstoffe, die Übelkeit und Erbrechen vorbeugen oder stoppen. Ihre Wirkung dauert 12 – 24 Stunden an. Die enthaltenen Wirkstoffe sind Meklozindihydrochlorid, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6) und Koffein
Stirnhöhle	Sinupret forte Dragées	3x / Tag 2 Dragées	Sinupret wirkt schleimlösend (sekretolytisch) und entzündungshemmend (antiphlogistisch). Dadurch löst Sinupret zähen Schleim, lässt verstopfte Nasen abschwellen und gestaute Sekrete leichter abfließen.
Schnupfen	Triofan Spray	3 - 4 / Tag maximum 5 - 7 Tage lang	Triofan Schnupfen ist ein lokal anzuwendendes Arzneimittel gegen Schnupfen, das ein Abschwellen der Nasenschleimhaut bewirkt und den schleimigen Nasenausfluss vermindert und verflüssigt. Dadurch wird das Atmen durch die Nase wieder möglich. Triofan Schnupfen wird zur Abschwellung der Nasenschleimhaut zur Erleichterung der Atmung bei Schnupfen verwendet.
Sonstige Infekte Darm	Co-Amoxi 1mg	1 - 0 - 1 1/2 Std vor der Mahlzeiten	Clavulansäure beherrscht den Hauptabwehr- oder Resistenzmechanismus zahlreicher resistenter Bakterien gegenüber Penicillinen und schützt auf diese Weise Amoxicillin, das damit die Bakterien zerstören kann. Diese Wirkungsweise macht Co-Amoxicillin Sandoz gegen zahlreiche bakterielle Infektionen wirksam.
Ekzeme	Elconom Salbe	1x täglich	Elocom mit dem Wirkstoff Mometasonfuroat wird verwendet bei entzündlichen oder allergischen Erkrankungen der Haut. Elocom lindert: Schmerzen Juckreiz Brennen
Prellungen, Verstauchungen	Traumaflix Forte 100mg		Zur äusserlichen Behandlung von Schmerzen, Entzündungen und Schwellungen bei: Verstauchungen, Prellungen und Zerrungen (z.B. bei Sportverletzungen). Als unterstützende Massnahme zur lokalen Behandlung von rheumatischen Beschwerden des Bewegungsapparates.
Malariamittel	Malarone Atovaquone Proguanil		Die fixe Kombination aus Atovaquon und Proguanil (Malarone® und zahlreiche Generika) kann zur Prophylaxe und Therapie, einschließlich der notfallmäßigen Selbstbehandlung von unkomplizierten Infektionen durch P. falciparum und zur Akutbehandlung anderer Malariaformen eingesetzt werden.

Wundverschluss	Steri-Strips		Steri-Strips sind selbstklebende Wundnahtstreifen, die man verwendet, um kleine oder oberflächliche Wunden geschlossen zu halten, so dass sie abheilen können.
	Sprühpflaster		Der Sprühverband eignet sich besonders für oberflächliche Wunden der Haut und kann auch Hautpartien abdecken die mit herkömmlichen Pflastern nicht geschützt werden können. Einfach auf die gereinigte Wunde aufsprühen.
Wunden desinfizieren	Merfen		Merfen eignet sich zur Desinfektion von Wunden und Verletzungen, wie Kratz- und Schürfwunden, Schnittwunden, leichten Verbrennungen (oberflächlichen, kleinflächigen Verbrennungen 1. Grades), sowie von Insektenstichen.
Bissen desinfizieren	Betadine		Betadine Lösung standardisiert wird angewendet zur Desinfektion der Haut und Schleimhaut sowie zur Desinfektion von kleineren Wunden, Hautrissen, Schürfungen und kleinflächigen, leichten Verbrennungen (Verbrennungen ohne Blasenbildung). Ausschliesslich auf ärztliche Verschreibung wird Betadine Lösung standardisiert zur Behandlung von infizierten Wunden angewendet.
Verbandszeug Fieberthermometer	Verbandspflaster Heftpflaster Elastische Binden (8cm) Einmalhandschuhe Desinfektionsmittel für Hände/Gegenstände Pinzette Sicherheitsnadeln Verbandsschere Thermometer		
Atembeschwerden nach Insktenstich	Notfallset am Schlüsselanhänger Inhalt: 2x Xyzal, 10 mg Cetirizin 2x Spiricort, 50 mg	alle 4 Tabletten auf Einmal	Die Reaktionen treten nach Kontakt mit dem Allergen sehr rasch und unerwartet auf. Erste Anzeichen sind: Jucken und Anschwellen der Handinnenflächen oder Fusssohlen, der Augenlider, der Mundschleimhaut, Lippen oder Zunge; Juckende Quaddeln (rote, erhöhte Hautstellen); Atembeschwerden, Atemnot, Hustenattacken; Magen-Darm-Beschwerden (Bauchkrämpfe, Erbrechen, Durchfall); Starker Schwindel. Gefühl von Kraftlosigkeit;

Eine obligatorische Ersthilfe-Koffer befindet sich in der Fahrerkabine